

第十二章 消化道疾病

- (C) 1. 會併發惡性貧血的胃疾病是：(A)急性胃炎 (B)幽門阻塞 (C)慢性萎縮性胃炎 (D)慢性肥厚性胃炎。
- (D) 2. 胃癌最好發於：(A)賁門處 (B)胃大彎處 (C)胃體部 (D)胃小彎處及幽門竇。
- (C) 3. 下列關於大腸癌的敘述，何者為真？(A)與家族性息肉症無關 (B)發生於上行結腸與橫行結腸者多 (C)最容易發生轉移的器官為肝臟 (D)後期，大便會出現潛血反應。
- (B) 4. 下列何者與胃癌發生的關係最小？(A)慢性胃炎 (B)部分胃切除 (C)病毒感染 (D)煙燻醃製食物。
- (B) 5. 下列有關消化性潰瘍之論述，何者正確？(A)胃潰瘍的病因與幽門螺旋桿菌感染無關 (B)慢性消化性潰瘍最好發的部位為十二指腸 (C)十二指腸潰瘍的主因是胰臟分泌重碳酸鹽太多 (D)十二指腸潰瘍與胃蛋白 分泌增加無關。
- (B) 6. 下列之一何者是消化性潰瘍最常發生的位置？(A)食道和胃 (B)胃和十二指腸 (C)十二指腸和空腸 (D)空腸和迴腸。
- (D) 7. 胃癌遠處轉移到卵巢時常稱為：(A)Virchow 結節 (B)Pott 氏病 (C)Warthin 氏腫瘤 (D)Krukenberg 腫瘤。
- (A) 8. 下列消化道先天性畸型中，何者最早出現明顯臨床症狀？(A)食道閉鎖 (B)先天性幽門狹窄 (C)梅克耳氏憩室(Meckel's diverticulum) (D)巨結腸症。食道閉鎖的胎兒因無法吞嚥羊水，故孕婦會因羊水過多而出現症狀。
- (A) 9. 下列何者不是潰瘍性腸炎的特徵？(A)好發於迴腸 (B)主要病灶侷限於黏膜層 (C)在腸腺底部有腸腺膿瘍 (D)末期的併發症包括腺癌。
- (C) 10. 現在致癌理論中與胃癌及胃淋巴瘤最相關之致癌因子為：(A)壓力(stress)(B)胃酸(gastric acid) (C)幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori) (D)貧血(anemia)。

第十三章 肝臟、膽囊與胰臟疾病

- (D) 1. 荳蔻肝(nutmeg liver)之原因，大多為：(A)急性肝炎 (B)慢性肝炎 (C)左心衰竭 (D)右心衰竭。荳蔻肝為肝臟長期鬱血的表現，右心衰竭會引起肝臟鬱血。
- (B) 2. 下列有關膽道閉鎖(Biliary atresia)之敘述何者不對？(A)不易與新生兒黃疸區分 (B)預後良好 (C)多發生於嬰兒 (D)有黃疸出現。新生兒膽道閉鎖須進行換肝手術才可能存活。
- (C) 3. 黃疸是因膽汁中何項物質沈積於皮膚和鞏膜而形成？(A)膽鹽 (B)膽固醇 (C)膽紅素 (D)卵磷質。
- (C) 4. 下列哪種肝炎比較容易在輸血後引起急性肝炎？(A)A 型 (B)B 型 (C)C 型 (D)E 型。
- (C) 5. 一年輕病人接受膽囊切除手術，發現其內含有數個黑而堅硬的結石，則：(A)此結石主要成分是膽固醇 (B)此病好發在肥胖女性 (C)此病人可能有溶血性貧血 (D)此種結石絕不會發生在肝臟。

- (B) 6. 肝細胞癌和下列何者病毒感染最有關連？(A)HPV (B)HBV (C)CMV(D)EBV。
- (B) 7. 血色沈著病(hemochromatosis)係下列何者代謝異常所致？(A)鋅 (B)鐵(C)銅 (D)鎂。
- (D) 8. 急性胰臟炎，最主要的病理變化包括下列，除了：(A)壞死 (B)出血 (C)急性炎症反應 (D)脂肪變性。
- (D) 9. 慢性 C 型肝炎與下列那一種腎絲球腎炎關聯性最密切？(A)膜性腎絲球腎炎(membranous glomerulonephritis) (B)微小變化疾病(minimal change disease) (C)局部段落性腎絲球硬化(focal segmental glomerulosclerosis) (D)膜性增殖性腎絲球腎炎(membranoproliferative glomerulonephritis)。
- (A) 10. 肝細胞癌在組織病理上是屬於一種：(A)腺癌 (B)類癌 (C)鱗狀細胞癌(D)移行上皮癌。

第十四章 腎臟與泌尿道疾病

- (C) 1. 下列哪一種泌尿系統之腫瘤好發於小兒？(A)腎細胞癌 (B)過渡細胞癌(C)Wilms 氏腫瘤 (D)過渡細胞乳突瘤。
- (B) 2. 非淋菌性尿道炎最常見之致病原是：(A)梅毒螺旋菌 (B)砂眼披衣菌(*Chlamydia trachomatis*) (C)陰道滴蟲(*Trichomonas vaginalis*) (D)念珠菌(*Candida*)。
- (D) 3. 泌尿道阻塞的病變中，最常見的是：(A)尿道癌 (B)前列腺癌 (C)淋病性尿道炎 (D)良性前列腺肥大。
- (B) 4. 腎病症候群中，兒童最常見的腎小球疾病是：(A)膜厚性腎小球腎病(membranous nephropathy) (B)微小變化性腎病(minimal change nephropathy) (C)膜厚增殖性腎小球腎炎(membranoproliferative glomerulonephritis) (D)感染後腎小球腎炎(postinfectious glomerulonephritis)。
- (D) 5. 下列何者不是腎病症候群(nephrotic syndrome)的表現？(A)每日尿蛋白超過 3.5 gm (B)高血脂症(hyperlipidemia) (C)低白蛋白血症(hypoalbuminemia) (D)高膽紅素血症(hyperbilirubinemia)。
- (A) 6. 下列何種腎絲球疾病的預後最差，最易惡化至腎衰竭？(A)快速進行性腎絲球腎炎 (B)膜厚性腎絲球腎炎 (C)IgA 腎病變 (D)微小變化性腎絲球疾病。
- (C) 7. 下列何者不是腎病症候群(nephrotic syndrome)之表現？(A)水腫(edema) (B)脂尿(lipiduria) (C)血尿(hematuria) (D)每天蛋白尿超過 3.5 g/1.73 m。
- (B) 8. 下列何者會導致嬰幼兒期的腎衰竭？(A)成人多囊腎(adult polycystic kidney disease) (B)兒童多囊腎(childhood polycystic kidney disease)(C)單側腎不發生(unilateral renal agenesis) (D)馬蹄腎(horseshoe kidney)。
- (A) 9. 女性泌尿道發炎機率比男性高，因為：(A)女性的尿道較短 (B)女性的尿道較長 (C)女性的輸尿管較短 (D)女性的輸尿管較長。
- (B) 10. 腎病症候群之指標不包括下列何者？(A)蛋白尿 (B)高血壓 (C)全身性水腫 (D)高血脂症。

第十五章 男性生殖系統疾病

- (B) 1. 前列腺之惡性癌最常發生在：(A)前葉 (B)後葉 (C)正中葉 (D)側葉。
- (C) 2. 前列腺結節狀增生(benign prostatic hypertrophy; BPH)之敘述，下列何者正確？
(A)前列腺由正常的 10 gm 增殖到 30 gm (B)好發於前列腺後葉 (C)最常見的手術式為 TURP(transurethral resection of prostate) (D)大多數的病患 (50%以上)，在手術後數年會轉化為腺癌。
- (D) 3. 在男性，最常造成尿道阻塞的病變是：(A)尿道癌瘤 (B)淋病尿道炎之後纖維化 (C)前列腺癌 (D) 前列腺結節狀增生。
- (C) 4. 攝護腺癌最常轉移之處為何者？(A)腦 (B)肝臟 (C)骨骼 (D)腎臟。
- (D) 5. 有關隱睪症(cryptorchidism)之敘述何者錯誤？(A)發生率偏低，約為 1% (B)可發生雙側或單側 (C)隱睪症易造成睪丸萎縮及不孕 (D)不會增高睪丸癌之發生率。
- (A) 6. 細菌性前列腺炎最常見之致病菌為？(A)大腸桿菌 (B)金黃色葡萄球菌 (C)綠膿桿菌 (D)以上皆非。
- (D) 7. 陰莖癌之前區病症包括？(A)波文氏病 (B)波文樣丘疹病 (C)凱拉氏紅斑瘤 (D)以上皆是。
- (B) 8. 大多數前列腺癌屬於何種類型癌症？(A)小細胞癌 (B)腺癌 (C)鱗狀細胞癌 (D)柱狀細胞癌。
- (A) 9. 腮腺睪丸炎好發於何年齡層？(A)學齡兒童 (B)20~40 歲 (C)45~55 歲 (D)65 歲以上。
- (C) 10. 兒童因先天泌尿道缺陷，易感染何種菌引起睪丸癌或副睪丸炎？(A)梅毒螺旋體 (B)披衣菌 (C)格蘭氏陰性菌 (D)淋病球菌。

第十六章 女性生殖系統疾病

- (C) 1. 關於乳房良性腫瘤之敘述，下列何者正確？(A)管內乳頭狀瘤(intraductal papilloma)多發生在外上 1/4 乳房組織 (B)葉狀囊肉瘤(cystosarcoma phyllodes)好發於年輕女子 (C)纖維腺瘤(fibroadenoma)的大小通常不隨月經週期變化 (D)以上皆是。
- (D) 2. 原發性卵巢癌中，以何種最常見？(A)生殖細胞癌(germ cell tumor) (B)性腺間質癌(gonadal stromal tumor) (C)淋巴瘤(lymphoma) (D)生發上皮癌(germinal epithelial carcinoma)。
- (C) 3. 女性子宮頸最常見癌症類別為：(A)惡性黑色素瘤 (B)腺癌 (C)類上皮癌 (D)惡性淋巴瘤。
- (D) 4. 卵巢腫瘤切面可見毛髮、牙齒、鈣化物及黃色皮脂樣物質，其最可能診斷為：(A)黏液性囊狀腺瘤 (B)漿液性囊狀腺瘤 (C)轉移性腺癌 (D)畸胎瘤。
- (D) 5. 婦女流產最常見原因為：(A)藥物影響 (B)子宮畸形 (C)外傷 (D)受精卵及胎兒本身異常。
- (C) 6. 在孕婦生產過程中進入子宮，造成產褥熱，嚴重時會造成子宮內膜炎或敗血症的細菌，最常見的是下列哪一種？(A)沙門氏桿菌 (B)金黃色葡萄球菌 (C)鏈球菌 (D)肺炎雙球菌。

- (D) 7. 下列有關於乳房纖維性囊腫疾病之敘述中，何者不對？(A)與荷爾蒙失調有關 (B)乳小管阻塞所造成 (C)基質會發生纖維化 (D)患乳癌的機率會低。
- (B) 8. 一女性病人陰部有搔癢，且有泡沫之黃綠色白帶，陰道分泌物在顯微鏡下，可見梨形擺動的蟲體，請問最有可能是哪一種病？(A)白色念珠菌感染 (B)陰道毛滴蟲病 (C)淋病雙球菌感染 (D)陰蝨病。
- (C) 9. 最有可能造成陰道及子宮腔積血的疾病是：(A)子宮頸癌 (B)子宮內膜癌 (C)處女膜閉鎖 (D)子宮肌瘤。
- (B) 10. 子宮頸癌 75%為：(A)腺體癌 (B)鱗狀上皮癌 (C)管狀癌 (D)以上皆是。

第十七章 內分泌系統疾病

- (D) 1. 關於甲狀腺癌的敘述，哪一項是錯的：(A)乳突狀癌最多 (B)濾泡狀癌易發生血行轉移至肺、骨等 (C)前兩者的開刀後生存率均高 (D)濾泡狀癌以甲狀腺機能亢進為主徵。
- (A) 2. 以下何者常發生於更年期之後的婦女？(A)骨質疏鬆症(osteoporosis) (B)副甲狀腺機能亢進(hyperparathyroidism) (C)副甲狀腺機能低下(hypoparathyroidism) (D)佝僂症(rickets)。
- (D) 3. 下列何者為最常見之甲狀腺惡性腫瘤？(A)濾泡癌(follicular carcinoma)(B)髓狀癌(medullary carcinoma) (C)未分化癌(undifferentiated carcinoma) (D)乳突狀癌(papillary carcinoma)。
- (C) 4. 下列敘述何者正確？(A)庫欣氏症候群(Cushing's syndrome)是因腎上腺皮質分泌太少所致 (B)性皮質素(androgen)分泌過多會造成女性幼童第二性徵過早發育 (C)礦皮質素(mineralocorticoid)分泌過多會引起高血壓 (D)庫欣氏症候群患者皮膚較黑是 ACTH 的作用。
- (C) 5. 幼兒與成人甲狀腺機能低落者，依序會產生下列何種症狀？(A)呆小症、肝硬化 (B)肝硬化、夜盲症 (C)呆小症、黏液性水腫 (D)黏液性水腫、巨人症。
- (B) 6. 艾迪森氏症(Addison's disease)是因為下列何種內分泌腺功能不足所引起？(A)腎上腺髓質 (B)腎上腺皮質 (C)胰臟 (D)甲狀腺。
- (B) 7. 腎上腺轉移性癌(metastatic carcinoma)之來源最常見的是：(A)腸胃道癌(B)肺癌 (C)惡性黑色素瘤 (D)惡性淋巴瘤。
- (D) 8. 動物在切除副甲狀腺後，除了引起手足之搖弱外，同時可發現下列何者會明顯的降低？(A)血鉀 (B)血鐵 (C)血鈉 (D)血鈣。
- (D) 9. 下列何種荷爾蒙不是腦下垂體(pituitary gland)所分泌？(A)ACTH(adrenocorticotrophic hormone) (B)TSH(thyroid-stimulating hormone) (C)ADH(antidiuretic hormone) (D)PIF(prolactin inhibition factor)。
- (B) 10. 庫欣氏症候群(Cushing's syndrome)主要是因體內何種激素分泌過多所致？(A)動情素(estrogen) (B)皮質醇(cortisol) (C)黃體素(progesterone) (D)雄性素(androgen)。

第十八章 中樞神經系統疾病

- (B) 1. 侵犯背根神經節細胞者是何種病原菌？(A)小兒麻痺 (B)梅毒 (C)腮腺炎 (D)腺病毒。
- (A) 2. 喜歡侵犯前根神經節細胞者是下列何種病原菌？(A)小兒麻痺 (B)柯沙奇 (C)麻疹 (D)梅毒。
- (B) 3. 下列哪一項腦病與維他命缺乏的相關性最少？(A)Wernicke 氏病 (B)Huntington 氏舞蹈病 (C)Korsakoff 氏精神病 (D)脊髓之亞急性合併變性。
- (A) 4. 阿茲海默氏病(Alzheimer's disease)和下列哪個系統的退化最為相關？(A)多巴胺系統(dopaminergic system) (B)膽鹼類系統(cholinergic system) (C)腎上腺類系統(adrenergic system) (D)GABA 系統(GABAergic system)。
- (D) 5. 以下何種構造受到傷害後會引起運動性顫抖和運動失調症？(A)延腦 (B)橋腦 (C)間腦 (D)小腦。
- (A) 6. 下列何種細胞在缺氧(hypoxic-ischemic)下最容易受傷害？(A)神經元(neuron) (B)星狀細胞(astrocyte) (C)寡樹突細胞(oligodendrocyte) (D)腦室膜細胞(ependymal cell)。
- (B) 7. 下列有關脊髓灰白質炎(poliomyelitis)之敘述，何者正確？(A)大多因節肢動物傳染性病毒(arbovirus)感染 (B)因中樞神經系統之下運動神經元(lower motor neuron)被侵犯所致 (C)胞質內之包涵體—尼氏小體(Negri body)最具診斷價值 (D)胞核內之包涵體—尼氏小體(Negri body)最具診斷價值。
- (A) 8. 失智症(dementia)最常見的原因是：(A)阿茲海默氏病(Alzheimer disease) (B)腦血管疾病(cerebrovascular disease) (C)杭汀頓氏病(Huntington disease) (D)帕金森氏病(Parkinson disease)。
- (B) 9. 髓芽母細胞瘤(medulloblastoma)好發於：(A)大腦半球 (B)小腦 (C)腦幹 (D)腦室。
- (C) 10. 帕金森氏病(Parkinson's disease)是因下列何者發生異常所致？(A)大腦皮質的上運動神經元 (B)脊髓的下運動神經元 (C)基底核的黑質(substantia nigra) (D)尾核(caudate nucleus)。

第十九章 骨骼、關節、肌肉與軟組織疾病

- (B) 1. 下列何種病變最不會造成骨折？(A)骨肉瘤(osteosarcoma) (B)骨軟骨瘤(osteochondroma) (C)派吉特氏病(Paget's disease) (D)骨質疏鬆症(osteoporosis)。
- (C) 2. 骨骼之佩吉氏病(Paget's disease)又稱畸形骨炎(osteitis deformans)，最可能之特性或病變為何？(A)好犯於 40 歲以下之女性 (B)血中鹼性磷酸下降 (C)病患得骨肉瘤之機會增加 (D)附近皮膚上皮內有佩吉細胞(Paget cell)。
- (A) 3. 第三型纖維母細胞生長因子接受體(Fibroblast growth factor receptor 3; FGFR3)之基因發生突變的病變為何？(A)軟骨發育不全(achondroplasia) (B)骨發生不全(osteogenesis imperfecta) (C)化膿性骨髓炎(pyogenic osteomyelitis) (D)骨

- 肉瘤(osteosarcoma)。
- (B) 4. 下列哪一種疾病的特徵為關節軟骨的蝕損？(A)類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis) (B)骨關節炎(osteoarthritis) (C)脫臼(dislocation) (D)骨質疏鬆(osteoporosis)。
- (C) 5. 下列何者是位於關節或是肌腱旁的一種小病變？(A)骨瘤(osteoma) (B)纖維瘤(fibroma) (C)腱鞘囊腫(ganglion) (D)脂肪瘤(lipoma)。
- (C) 6. 下列有關多發性骨髓瘤(multiple myeloma)的敘述，何者錯誤？(A)是一種源自漿細胞的惡性腫瘤 (B)常因骨質被破壞而發生病理性骨折(pathologic fracture) (C)血清的鈣離子濃度常低於正常值 (D)容易造成骨髓瘤性腎病(myeloma nephrosis)。
- (D) 7. 一名 75 歲的女子長期背痛，有嚴重的駝背和脊椎前凸，X 光發現右股骨頸有骨折，數節脊椎的椎體有壓迫性骨折，骨骼皮質變薄等變化。病人最可能的診斷為何？(A)骨髓炎(osteomyelitis) (B)帕哲氏病(Paget disease) (C)佝僂病(rickets) (D)骨質疏鬆症(osteoporosis)。
- (B) 8. 較易好發於 20 歲以下年輕人的骨腫瘤是：(A)軟骨肉瘤(chondrosarcoma) (B)骨肉瘤(osteosarcoma) (C)骨髓瘤(myeloma) (D)骨軟骨瘤(osteochondroma)。
- (C) 9. 佝僂病(rickets)是缺少何種維生素所導致的骨骼疾病？(A)維生素 B12 (B)維生素 C (C)維生素 D (D)維生素 E。
- (A) 10. 下列何者不屬於類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis)的特點？(A)非侵蝕性關節炎 (B)對稱性關節炎 (C)晨間關節僵硬大於一小時 (D)特殊皮下結節。

第二十章 造血與淋巴系統疾病

- (A) 1. 鑑別診斷慢性骨髓性白血病(chronic myeloid leukemia)和類白血病反應(leukemoid reaction)的最重要指標為何？(A)費城染色體(philadelphia chromosome) (B)嗜伊紅血球增加 (C)白血球總數是否超過 50 10/L(D)不正常白血球出現與否。
- (B) 2. 下列那種情況與新生兒溶血現象的發生最有關連？(A)母親為 Rh 陽性血型，胎兒為 Rh 陰性血型 (B)母親為 Rh 陰性血型，胎兒為 Rh 陽性血型 (C)母親及胎兒均為 Rh 陽性血型 (D)母親及胎兒均為 Rh 陰性血型。
- (B) 3. 下列何種維生素缺乏會造成巨紅血球性貧血？(A)A (B)B (C)C (D)D。
- (A) 4. 脾腫大(splenomegaly)不常見於下列何種疾病？(A)再生不良性貧血(aplastic anemia) (B)肝硬化(liver cirrhosis) (C)感染性單核球增多症(infectious mononucleosis) (D)遺傳性球狀血球症(hereditary spherocytosis)。
- (A) 5. 某 13 歲中學女生，體檢時發現小球性(microcytic)貧血，無缺鐵或寄生蟲疾病，最可能之病變為何？(A)海洋性貧血 (B)溶血性貧血 (C)葉酸缺乏 (D)維生素 B12 缺乏。
- (B) 6. 下列哪一型的何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)預後情形最佳？(A)結節硬化型(nodular sclerosis) (B)淋巴球突顯型(lymphocyte predominance) (C)淋巴球缺乏型(lymphocyte depletion) (D)混合細胞型(mixed cellularity)。

- (D) 7. 奧爾氏桿(Auer rod)出現在下列何種疾病的病變細胞中？(A)巨母紅血球性貧血(megaloblastic anemia) (B)何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin's lymphoma) (C)多發性骨髓瘤(multiple myeloma) (D)急性骨髓細胞性白血病(acute myelocytic leukemia)。
- (D) 8. 下列何種疾病可引起自體脾切除(autosplenectomy)現象？(A)肝硬化 (B)高雪氏病(Gaucher's disease) (C)感染性單核球增多症(infectious mononucleosis) (D) 鎌狀細胞貧血(sickle cell anemia)。
- (A) 9. 兒童最常見的白血病是：(A)急性淋巴球性白血病 (B)急性骨髓細胞性白血病 (C)慢性淋巴球性白血病 (D)慢性骨髓細胞性白血病。
- (C) 10. 鎌狀血球貧血(sickle cell anemia)可出現：(A)HbA (B)HbB (C)HbS(D)HbP。